



Ljubljana, 19.6.2023


Odmerjanje penicilina V (Ospen tablete) pri otrocih

V primeru pomanjkanja Ospen sirupa pri otrocih podajamo priporočila za odmerjanje Ospen tablet glede na telesno maso in starost otroka:

| Telesna masa | starost | Standardni odmerek Ospena za pljučnico in vnetje srednjega ušesa (dnevni odmerek 100-200.000 IE/kg) | Odmerek Ospena za streptokokno angino in škrlatinko (dnevni odmerek 40-80.000 IE/kg) |
|--------------|-----------|---|--|
| 10-15 kg | 1-3 let | 0,5 tbl Ospen 1000 na 8 ur ali 0,5 tbl Ospen 1500 na 8 ur | 0,5 tbl Ospen 1000 na 12 ur |
| 16-22 kg | 3-6 let | 0,5 tbl Ospen 1500 na 8 ur ali 1 tbl Ospen 1000 na 8 ur | 0,5 ali 1 tbl Ospen 1000 na 12 ur |
| 23-32 kg | 6-10 let | 1 tbl Ospen 1000 na 8 ur ali 1 tbl Ospen 1500 na 8 ur | 1 tbl Ospen 1000 na 12 ur |
| 33-49 kg | 10-14 let | 1 tbl Ospen 1500 na 8 ur | 1 tbl Ospen 1000 na 8 ali 12 ur |

Za zdravljenje šena (dnevni odmerek 80.000 IE/kg) priporočamo posamični odmerek kot za angino, le da se daje na 8 in ne na 12 ur.

Priporočamo predpis tistega odmerka, ki najbolj ustreza telesni masi otroka in njegovemu kliničnemu stanju oz. diagnozi. Pri telesni teži pod 10 kg priporočamo pripravo praškov ali uporabo amoksicilina v obliki suspenzije.


doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
Strokovni direktor Pediatrične klinike

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Klinika za infekcijske bolezni
in vročinska stanja
Ljubljana, Japljeva ulica 2 3

dr. Tina Plankar Srovin, dr. med.
Vodja konzilijarne in konzultantske službe za otroke
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja



