




PRIMERJALNI ODMERKI OPIOIDOV

morfin po (mg)	30	60	120	180	240	300	360	420	480
tramadol (mg)	150	300	600	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
oksikodon (mg)	⊗	30	60	90	120	150	180	210	240
hidromorfon (mg)	4	8	16	24	32	40	48	52	64
tapentadol (mg)	⊗	150	300	450	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
fentanil (mcg/h)	12,5	25	50	75	100	125	150	175	200
buprenorfin (mcg/h)	⊗	35	52,5	70	105	122,5	140	⊗	⊗

morfin po : sc = 3 : 1, sc = iv, priporočen rešilni odmerek morfina je 10–15% dnevne (24-urne) porabe



Projekt Metulj
*za bolnike z neozdravljivo
boleznijo in njihove bližnje*
www.paliativnaoskrba.si



Slovensko združenje
paliativne in hospic oskrbe

POGOSTO PREDPISANA ZDRAVILA V PALIATIVNI OSKRBI

	morfin	haloperidol	lorazepam	midazolam	butilskopolamin
pot vnosa	po / sc	po / sc	sl / po	po / sc	po / sc
čas do učinka	15`-20` (sc) 15`-60` (po)	10`-15` (sc) 60` (po)	5` (sl) 10`-15` (po)	5`-10` (sc) 10`-20` (po)	10` (sc) 60`-120` (po)
trajanje učinka	3-6h	18-24h	6-72h	4h	4h
maks. odmerek	Titriraj!	30-50mg/24 ^h	6-8mg/24 ^h	20-100mg/24 ^h	40-120mg/24 ^h
neželeni učinki	zaprtje, sedacija, slabost, retenca urina	sedacija, motnje motorike, antiholinergični sindrom	sedacija, utrujenost, zmanjšana koordinacija	sedacija, utrujenost, zmanjšana koordinacija	antiholinergični sindrom midriaza meglen vid

sc = subkutano (podkožno), po = per os (oralno), sl = sublingvalno (podjezično)