

Točkovalnik za vključitev bolnika (starost > 1 leto) v pediatrično paliativno oskrbo

(po: PaPaS skali, verzija 3. Bergstraesser E, Hain RD, Pereira JL. The development of an instrument that can identify children with palliative care needs: the Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale): a qualitative study approach. BMC Palliat Care 2013; 12: 1–14.)

Zap. št.	Področje	Značilnosti	Točke	
1.	Potek bolezni in vpliv na dnevne aktivnosti otroka			
1.1.	Potek bolezni in vpliv na dnevne aktivnosti otroka v primerjavi z zdravimi vrstniki (za vsaj zadnje 4 tedne)	Stabilno stanje	0	
		Počasi napredujoča bolezen brez vpliva na dnevne aktivnosti	1	
		Nestabilno stanje. Z vplivom, omejitvijo dnevnih aktivnosti.	2	
		Hitro napredujoča bolezen s pomembno omejitvijo dnevnih aktivnosti	4	
1.2.	Povečana potreba po bolnišnični obravnavi (> 50% znotraj 3 mes., primerjalno za nazaj)	Ne	0	
		Da	3	
2.	Pričakovani izid zdravljenja osn. bolezni in breme zdravljenja			
2.1.	Zdravljenje usmerjeno proti osn. bolezni (ne pomeni zdravljenja simptomov, kot so bolečina, dispneja, utrujenosti)	Bolezen je ozdravljiva	0	
		Upočasnjuje napredek bolezni in podaljša življenje z dobro kvaliteto	1	
		Ne ozdravi bolezni in ne upočasni napredka, ampak ima ugoden učinek na kvaliteto življenja	2	
		Ne upočasni napredka in nima ugodnega učinka na kvaliteto življenja	4	
2.2.	Breme zdravljenja (pomeni stranski učinki zdravljenja, kot je npr. bivanje v bolnišnici, gledano z otrokove plati/plati družine)	Pričakovano nič ali minimalno	0	
		Nizko	1	
		Srednje	2	
		Veliko	4	
3.	Breme simptomov in zdravljenja			
3.1.	Intenzivnost simptomov ali možnost lajšanja simptomov	Bolnik je asimptomatski	0	
		Simptomi so blagi in jih enostavno olajšamo	1	
		Katerikoli izmed simptomov je težji, vendar ga lahko lajšamo	2	
		Katerikoli izmed simptomov je težji/težek in ga težko olajšamo (nepričakovane hospitalizacije ali ambul. obiski, krize)	4	
3.2.	Psihološka obremenitev bolnika zaradi simptomov	Odsotna	0	
		Blaga	1	
		Srednja	2	
		Izrazita	4	
3.3.	Psihološka obremenitev staršev ali družine zaradi otrokovih simptomov in trpljenja	Odsotna	0	
		Blaga	1	
		Srednja	2	
		Izrazita	4	

4.	Potrebe, želje bolnika ali staršev			
	Potrebe prepoznane s strani zdravstvenih delavcev			
4.1	Bolnik/starši si želijo paliativne oskrbe ali izrazijo potrebo	Ne	0 +vprašaj/upoštevaj 4.2.	
		Da	4 +vprašaj/upoštevaj 4.2.	
4.2.	Paliativni tim spozna, da bi bolniku koristila paliativna oskrba	Ne	0	
		Da	4	
5.	Pričakovana dolžina življenja			
5.1.	Pričakovana dolžina življenja	Več let	0 +vprašaj/upoštevaj 5.2.	
		Meseci do 1-2 leti	1 +vprašaj/upoštevaj 5.2.	
		Tedni do meseci	3 +vprašaj/upoštevaj 5.2.	
		Dnevi do tedni	4 +vprašaj/upoštevaj 5.2.	
5.2.	»Bi bili presenečeni, če bi otrok umrl v času 6 mesecev ?«	Da	0	
		Ne	2	
Skupna ocena:				

Vrednotenje stanja

Št. ugotovljenih točk	Ukrep
10-14 točk	paliativno oskrbo predstavimo družini
zdravljenje lahko podaljša življenje, vendar bolezen ni ozdravljiva	
15-24 točk	začnemo s paliativno oskrbo
pričakovana življenska doba < 1 leto	
komorbidnost	
zdravljenje lahko podaljša življenje, vendar bolezen ni ozdravljiva družina si želi paliativne oskrbe	
25-42 točk	paliativna oskrba je nujna
možna smrt v 6 mesecih	
intenzivnost simptomov je velika +/- možnost lajšanja simptomov je omejena	
naglo poslabšanje stanja	
obremenitev zaradi simptomov je srednje do veliko	
družina si želi paliativne oskrbe	
psihološka obremenitev bolnika ali družine je izrazita	